

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

備急千金要方卷十二至十四

詳校官太醫院醫士_臣舒岱

編修_臣倉聖脈覆勘

總校官中書_臣朱鈐

校對官中書_臣胡紹基

謄錄舉人_臣汪師曾

欽定四庫全書

備急千金要方卷十二

唐 孫思邈 撰

宋 林億等 校正

少小嬰孺方

欬嗽第六 方

小兒出胎二百許日頭身患小小瘡治護小瘡復發五
月中忽小小欬嗽微溫和治之因變癰一日二十過發
四肢縮動背脊狀眇眼反須臾氣絕良久復蘇已與常

治痢湯得快吐下經日不間爾後單與竹瀝汁稍進一日一夕中合進一升許發時小踈明日與此竹瀝湯得吐下發便大折其間猶稍稍與竹瀝汁

竹瀝湯方

竹瀝

合五

黃芩

銖三十

木防已

羚羊角

白朮

各六銖一作白鮮

大黃

銖二兩

茵芋

銖三

麻黃

白薇

桑寄生

萆薢

甘草

各半兩

右十二味㕮咀以水二升半煮取藥減半內竹瀝煎
取一升分服二合相去一食久進一服一方無
草薺
紫菀湯治小兒中冷及傷寒暴嗽或上氣咽喉鳴氣逆
或鼻塞清水出方

紫菀

杏仁

黃芩

當歸

甘草

橘皮

青木香

麻黃

桂心

各六
銖

大黃

一
兩

右十味㕮咀以水三升煮取九合去滓六十日至百

日兒一服二合半一百日至二百日兒一服三合

五味子湯治小兒風冷入肺上氣氣逆面青喘迫欬嗽
晝夜不息食則吐不下方

五味子

當歸

各半兩

麻黃

乾薑

桂心

人參

紫莞

甘草

各六兩

細辛

欬冬花

各二銖

大黃

一兩半

白朮

右十二味咬咀以水二升半煮取九合去滓兒六十
日至百日一服二合半一百日至二百日一服三合其

大黃別浸一宿下

一方無欬冬花大黃有大棗三枚

治小兒欬逆短氣胸中吸吸呵出涕唾嗽出臭膿
方

燒淡竹瀝煮二十沸小兒一服一合日五服大人一
升亦日五服不妨食息乳哺

治小兒寒熱欬逆膈中有癖乳若吐不欲食方

乾地黃

四兩

麥門冬

五味子

蜜

各半升

大黃

消石

各一兩

右六味呿咀以水三升煮取一升去滓內消石蜜煮
令沸服二合日三胸中當有宿乳汁一升許出大者
服五合

射干湯治小兒欬逆喘息如水雞聲方

射干

麻黃

紫菀

甘草

生薑

各一兩

半夏

五枚

桂心

五寸

大棗

二十枚

右八味呿咀以水七升煮取一升五合去滓內蜜五
合煎一沸分溫服二合日三

又方

半夏

兩四

紫苑

桂心

生薑

細辛

阿膠

甘草

兩各二

款冬花

合二

蜜

合一

右九味㕮咀以水一斗煮半夏取六升去滓內諸藥
煮取二升五合五歲兒服一升二歲服六合量大小
多少加減之服之立効

杏仁圓治大人小兒欬逆上氣方

杏仁三升熟搗如膏蜜一升為三分以一分內杏仁
搗令強更內一分搗之如膏又內一分搗熟止先食
已含咽之多少自在日三每服不得過半方寸匕則
利

又方

半夏

二斤去皮河水洗六七度完用

白礬

一斤為末

丁香

甘草

草豆蔻

川升麻

縮砂

各四兩粗搗

右七味以好酒一斗與半夏拌和勻同浸春冬三七

日夏秋七日密封口日足取出用冷水急洗風吹乾
每服一粒嚼破用薑湯下或乾喫候六十日乾方得

服

疑非孫
思邈方

八味生薑煎治少小嗽方

生薑

七兩

乾薑

四兩

桂心

二兩

甘草

款冬花

各三兩

紫苑

各三兩

杏仁

蜜

各一升

右合諸藥為末微火上煎取如飴餉量其大小多少
與兒含咽之百日小兒如棗核許日四五服甚有驗

四物款冬圓治小兒嗽晝瘥夜甚初不得息不能復啼
方

款冬花

紫菀

各一兩半

桂心

半兩

伏龍肝

六銖

右為末蜜和如泥取如棗核大傳乳頭令兒飲之日
三傳之漸漸令兒飲之

菖蒲圓治小兒暴冷嗽及積風冷嗽兼氣逆鳴方

菖蒲

烏頭

杏仁

礬石

細辛

皂莢

各六銖

款冬花

乾薑

桂心

紫苑

各十
八銖

蜀椒

五銖

吳茱萸

六合

右十二味為末蜜丸如梧子三歲兒飲服五丸加至
十凡日三兒小以意減之兒大以意加之暴嗽數服
便瘥

桂枝湯治少小十日已上至五十日卒得聲欬吐乳嘔
逆暴嗽晝夜不得息方

桂枝

半兩

甘草

二兩
半

紫苑

十八銖

闕

麥門冬

一兩十
八銖

右四味㕮咀以水二升煮取半升以綿著湯中捉綿滴兒口中晝夜四五過與之節乳哺

麻黃湯治少小卒肩息上氣不得安此惡風入肺方

麻黃

四兩

甘草

一兩

桂心

五寸

五味子

半升

半夏

生薑

各二兩

右六味㕮咀以水五升煮取二升百日兒服一合大小節度服之便愈

癖結脹滿第七

方灸法
霍亂附

雙紫圓治小兒身熱頭痛食飲不消腹中脹滿或小腹
絞痛大小便不利或重下數起小兒無異疾惟飲食過
度不知自止哺乳失節或驚悸寒熱惟此丸治之不瘥
更可重服小兒欲下是其蒸候哺食減少氣息不快夜
啼不眠是腹內不調悉宜用此丸不用他藥數用神驗
千金不傳方臣億等詳序例中凡云服紫丸者即前變
蒸篇中四味者是也云服紫丸不下者服
赤丸赤丸差駛病重者當用之方中並無赤丸
而此用朱砂又力緊於紫丸疑此即赤丸也

巴豆

麝核仁

各十

銖

麥門冬

十銖

甘草

五銖

甘遂

朱砂

各二銖

牡蠣

蠟

各八銖

右八味以湯熟洗巴豆研新布絞去油別搗甘草甘遂牡蠣麥門冬下篩訖研蕤核仁令極熟乃內散更搗二千杵藥燥不能相丸更入少蜜足之半歲兒服如荏子一雙一歲二歲兒服如半麻子一雙三四歲者服如麻子二丸五六歲者服如大麻子二丸七歲八歲服如小豆二丸九歲十歲微大於小豆二丸常以雞鳴時服至日出時不下者熱粥飲數合即下丸

皆雙出也下甚者飲以冷粥即止

治小兒胎中宿熱乳母飲食粗惡辛苦乳汁不起兒乳
哺不為肌膚心腹痞滿萎黃瘦瘠四肢痿痺繚戾服之
可令充悅方

芍藥

柴胡

各二兩

大黃

人參

各一兩

乾薑

如熟以枳實代

甘草

各半兩

鼈甲

茯苓

各一兩半

右八味為末蜜丸如大豆服一丸一歲已上乳服三
丸七歲兒服十丸日二

牛黃圓治小兒宿乳不消腹痛驚啼方

牛黃

三銖

附子

二枚

真珠

巴豆

杏仁

各一兩

右五味搗附子真珠為末下篩別搗巴豆杏仁令如泥內藥及牛黃搗一千二百杵藥成若乾入少蜜足之百日兒服如粟米一丸三歲兒服如麻子一丸五六歲兒服如胡豆一丸日二先乳哺了服之膈上下悲當微轉藥完出者病愈散出者更服以藥完出為

度

芒硝紫圓治小兒宿食癖氣痰飲往來寒熱不欲食消

瘦方

芒硝

大黃

各四兩

半夏

甘遂

各二兩

代赭

一兩

巴豆

二百枚

杏仁

一百二十枚

右七味為末別擣巴豆杏仁治如膏旋內藥末擣三千杵令相和合强者內少蜜百日兒服如胡豆一丸過百日至一歲服二丸隨兒大小以意節度當候兒

大便中藥出為愈若不出更服如初

治八歲已上兒熱結痰實不能食自下方

芍藥

梔子

知母

大黃

各二兩

柴胡

二兩
六銖

升麻

黃連

黃芩

各二兩半

竹葉

切一升半

桔梗

一兩半

細辛

十五銖半

右十一味呿咀以水六升煮取一升八合去滓分四

服十歲兒為三服一本有枳實杏仁各一兩半而無

桔梗黃連

治十五已下兒熱結多痰食飲減自下方

大黃

柴胡

黃芩

各三兩

枳實

一兩十八銖

升麻

芍藥

知母

梔子

各二兩半

生薑

十八銖

杏仁

三兩

竹葉

切一升半

右十一味㕮咀以水六升半煮取二升十歲至十五

者分三服

牛黃雙圓治小兒結實乳食不消心腹痛方

牛黃

太山甘遂

各半兩

真珠

六銖

杏仁

芍藥

黃芩

各一兩

巴豆

十八銖

右七味為末蜜丸一歲兒飲服如麻子二丸但隨兒大小加減之

牛黃鼈甲圓治少小癰實壯熱食不消化中惡忤氣方

牛黃

厚朴

茯苓

桂心

芍藥

乾薑

各半兩

鼈甲

麥麴

柴胡

大黃

枳實

芍藥

各一兩

右十二味為末蜜丸如小豆大日三服以意量之

芫花圓治小兒心下痞痰癖結聚腹大脹滿身體壯熱不欲哺乳方

芫花

黃芩

兩各一

大黃

雄黃

兩各二

右四味為末蜜和更擣一千杵三歲兒至一歲已下服如粟米一丸欲服丸內兒喉中令母與乳若長服消病者當以意消息與服之與乳哺相避

真珠圓治小兒痰實結聚宿癖羸露不能飲食方

真珠

兩半

麥門冬

兩一

麝仁

枚二百

巴豆

枚四十

右四味為未蜜丸。菴歲兒服二丸如小豆大二百日
兒服如麻子二丸漸增以知為度。當下病赤黃白黑
葵汁下勿絕藥。病盡下自止。久服使小兒肥白。已試
驗

鼈甲圓治少小腹中結堅脅下有疹手足煩熱方

鼈甲

芍藥

大黃

各三十銖

茯苓

柴胡

乾薑

各二十銖

桂心

六銖

廣蟲

蟻螯

各二十枚

右九味為末蜜和服如梧子七丸漸漸加之以知為度

鼈頭圓治小兒痞氣脅下腹中有積聚堅痛方

鼈頭

一枚

甘皮

半兩

蝨蟲

麝蟲

桃仁

各十八銖

右五味為末蜜丸服如小豆二丸日三大便不利加大黃十八銖以知為度

治小兒羸瘦懈宜常服不妨乳方

甘草五兩為末蜜丸一歲兒服如小豆十九日三服
盡即更合

桂心橘皮湯治小兒五六日不食氣逆方

桂心

人參

各半兩

橘皮

三兩

黍米

五合

成擇薤

五兩

右五味㕮咀以水七升先煮藥煎取二升次下薤米
米熟藥成稍稍服之

地黃圓治少小胃氣不調不嗜食生肌肉方

乾地黄

大黃

各一兩
六銖

茯苓

十八銖

當歸

柴胡

杏仁

各半兩

右六味為末以蜜丸如麻子大服五丸日三

馬通粟圓治少小脅下有氣內痛喘逆氣息難往來寒

熱羸瘦不食方

馬通中粟

十八銖

杏仁

紫苑

細辛

各半兩

五味子

石膏

秦朮

半夏

茯苓

各六銖

右九味為末蜜丸服如小豆十丸日三不知加至二十丸

治小兒下痢腹大且堅方

以故衣帶多垢者切一升水三升煮取一升分三服又方

腹上摩衣中白魚亦治陰腫

治少小腹脹滿方

燒父母指甲灰乳頭上飲之

又方

韭根汁和猪脂煎細細服之

又方

車轂中脂和輪下土如彈丸吞之立愈

又方

米粉鹽等分炒變色腹上摩之

治小兒癖

灸兩乳下一寸各三壯

欽定四庫全書

備急千金要方
卷十二

十二

當歸圓治小兒胎寒嘔啼腹中痛舌上黑青涎下方一名黑丸

當歸

狼毒

各九銖

吳茱萸

一作杏仁

蜀椒

各半兩

細辛

乾薑

附子

各十銖

巴豆

十枚

豉

七合

右九味搗七種下篩秤藥末令足研巴豆如膏稍稍
內末搗令相得蜜和桑椹盛蒸五升米飯下出搗一
千杵一月兒服如黍米一丸日一夜二不知稍加以

知為度亦治水癖

馬齒礬圓治小兒胎寒嘔啼驚癇腹脹不嗜食大便青黃并大人虛冷內冷或有實不可吐下方

馬齒礬一斤燒半日以棗膏和大人服如梧子二丸日三小兒以意減之以腹內溫為度有實實去神妙

治小兒忽患腹痛矢矯汗出名曰胎寒方

煮梨葉濃汁七合可三四度飲之

半夏圓治小兒暴腹滿欲死方

半夏隨多少微火炮之擣末酒和服如粟米粒大五
丸日三立愈

治小兒霍亂吐痢方

人參

一兩

厚朴

甘草

各半兩

白朮

十八銖

右四味㕮咀以水一升二合煮取半升六十日兒服
一合百日兒分三服暮歲分二服中間隔乳服之乳
母忌生冷油膩等一方加乾薑一分或加生薑三分
藿香湯治毒氣吐下腹脹逆害乳哺方

藿香

一兩

生薑

三兩

青竹茹

甘草

各半兩

右四味㕮咀以水二升煮取八合每服一合日三有
熱加升麻半兩

治孩子霍亂已用立驗方

人參

蘆薈

各半兩

藕豆藤

二兩

倉米

一撮

右四味㕮咀以水二升煮取八合分溫服

又方

人參

一兩

木瓜

一枚

倉米

一撮

右三味呔咀以水煮分服以意量之立効

治小兒霍亂方

研尿滓乳上服之

又方

牛涎灌口中一合

治少小吐痢方

亂髮半兩
燒灰

鹿角六
銖

右二味為末米汁服一升圭日三服

又方

熱牛尿含之一作牛膝

又方

燒特猪尿水解取汁少小服之

備急千金要方卷十二

欽定四庫全書

備急千金要方卷十三

唐 孫思邈 撰

宋 林億等 校正

少小嬰孺方

癰疽瘰癧第八

論方
灸法

漏蘆湯治小兒熱毒癰疽赤白諸丹毒瘡癰方

漏蘆

連翹

肘後用
白薇

白欬

芒硝

肘後用
芍藥

甘草

各六
銖

大黃

一兩

升麻

枳實

麻黃

黃芩

各九
銖

右十味㕮咀以水一升半煎取五合兒生一日至七日取一合分三服八日至十五日取一合半分三服十六日至二十日取二合分三服二十日至三十日取三合分三服三十日至四十日取五合分三服

後肘

治大人各用二兩大黃三兩以水一斗煮取三升分三服其丹毒須針鑱去血經心錄無連翹有知母芍藥犀角各等分

五香連翹湯治小兒風熱毒腫腫色白或有惡核瘰癧

附骨癰疽節解不舉白丹走竟身中白軫癢不已方

青木香

薰陸香

雞舌香

沉香

麻黃

黃芩

各六銖

大黃

二兩

麝香

三銖

連翹

海藻

射干

升麻

枳實

各半兩

竹瀝

三合

右十四味㕮咀以水四升煮藥減半內竹瀝煮取一升二合兒生百日至二百日一服三合二百日至暮歲一服五合一方不用麻黃

連翹圓治小兒無故寒熱強健如故而身體頸項結核瘰癧及心腹脇背裏有堅核不痛名為結風氣腫方

連翹

桑白皮

白頭翁

牡丹

防風

黃蘗

桂心

香豉

獨活

秦朮

各一兩

海藻

半兩

右十一味為末蜜丸如小豆三歲兒飲服五丸加至十凡五歲已上者以意加之

治丹毒大赤腫身壯熱百病不折方

寒水石

銖十六

石膏

銖十三

藍青

銖十二
用乾者

犀角

柴胡

杏仁

銖各八

知母

銖十

甘草

銖五

羚羊角

銖六

芍藥

黃芩

銖各七

梔子

銖十一

竹瀝

升一

生葛汁

四合
澄清

蜜

二兩

右十五味㕮咀以水五升并竹瀝煮取三升三合去

滓內杏仁脂葛汁蜜微火煎取二升一二歲兒服二

合大者量加之

麻黃湯治小兒丹腫及風毒風疹方

麻黃

半一兩

獨活

射干

甘草

桂心

青木香

石膏

黃芩

各一兩

右八味㕮咀以水四升煮取一升三歲兒分為四服

日再

又方治小兒惡毒丹及風疹方

麻黃

升麻

葛根

各一兩

射干

雞舌香

甘草

各半兩

石膏

合

右七味㕮咀以水三升煮取一升三歲兒分三服日

三

搗湯治小兒數十種丹方

大黃

甘草

當歸

芎藭

白芷

獨活

黃芩

芍藥

升麻

沉香

青木香

木蘭皮

各一兩

芒硝

三兩

右十三味㕮咀以水一斗二升煮取四升去滓內芒硝以綿搗湯中適寒溫搗之乾則易之取瘥止

治小兒溺竈丹初從兩股及臍間起走入陰頭皆赤方
桑根皮切一斗以水二斗煮取一斗以洗浴之

治小兒丹毒方

擣慎火草絞取汁塗之良其丹毒方具在別卷

治小兒赤遊腫若徧身入心腹即能殺人方

擣伏龍肝為末以雞子白和傅乾易之

又方白豆末水和傅之勿令乾

治小兒半身皆紅赤漸漸長引者方

牛膝

甘草

右二味㕮咀合得五升以水八升煮三沸去滓和伏龍肝末傳之

治小兒身赤腫起者方

熬米粉令黑以唾和傳之

又方

伏龍肝

亂髮灰

右二味為末以膏和傳之

治小兒卒腹皮青黑方

以酒和胡粉傅上若不急治須臾便死又灸臍上下左右去臍半寸并鳩尾骨下一寸凡五處各三壯五香枳實湯治小兒著風熱痞癰堅如麻豆粒瘡癢搔之皮剝汁出或偏身頭面年年常發者方

青木香

九銖

麝香

六銖

雞舌香

薰陸香

沉香

防風

秦朮

漏蘆

各半兩

升麻

黃芩

白欬

麻黃

各一兩

枳實

一兩半

大黃

一兩十銖

右十四味㕮咀以水五升煮取一升八合紀五六歲者一服四五合七八歲者一服六合十歲至十四五者加大黃半兩足水為一斗煮取二升半分三服
治小兒火灼瘡一身盡有如麻豆或有膿汁乍痛乍癢
方

甘草

芍藥

白斂

黃芩

黃連

黃蘗

苦參

各半兩

右七味為末以蜜和傳之日二夜一亦可作湯洗之
治小兒瘡初起燥漿似火瘡名曰燥瘡亦名爛瘡方
桃仁熟搗以面脂和傳之亦治徧身赤腫起

又方馬骨燒灰傳之

水銀膏治小兒熱瘡方

水銀

胡粉

松脂

各三兩

右三味以豬脂四升煎松脂水氣盡下二物攪令勻
不見水銀以傳之

治小兒上下徧身生瘡方

芍藥

黃連

黃芩

兩各三

苦參

兩八

大黃

兩二

蛇床子

升一

黃蘗

兩五

拔藁

斤一

右八味㕮咀以水二斗煮取一斗以浸浴兒

苦參湯浴小兒身上下百瘡不瘥方

苦參

兩八

地榆

黃連

王不留行

獨活

艾葉

兩各五

竹葉

升二

右七味㕮咀以水三斗煮取一斗以浴兒瘡上浴訖

傳黃連散

治三日小兒頭面瘡起身體大熱方

升麻

柴胡

石膏

各六銖

甘草

當歸

各十銖

大黃

黃芩

各十銖

右七味㕮咀以水四升煮取二升分服日三夜一量
兒大小用之

治小兒身體頭面悉生瘡方

榆白皮隨多少曝令燥下篩醋和塗綿以傳瘡上蟲

自出亦可以猪脂和塗之

枳實圓治小兒病風癢癢痛如疥搔之汁出徧身瘡癰
如麻豆粒年年喜發面目虛肥手足乾枯毛髮細黃及
肌膚不光澤鼻氣不利此則少時熱盛極體當風風相
薄所得也不早治之成大風疾方

枳實

一兩

菊花

蛇床子

防風

蒺藜子

白薇

浮萍

各一兩

天雄

麻黃

漏蘆

各半兩

右十味為末蜜和如大豆許五歲兒飲服十丸加至
二十九日二五歲已上者隨意加之兒大者可為散服
治小兒風癢癭疹方

蒴藿

防風

羊桃

石南

秦椒

升麻

苦參

茵芋

芫花

一云芫蔚

蒺藜

蛇床子

枳實

礬石

各一兩

右十三味㕮咀以漿水三斗煮取一斗去滓內礬令

小沸浴之

又方牛膝末酒服方寸匕漏瘡多年不瘥擣末傳之亦主骨疽癰疾瘰癧絕妙

澤蘭湯主丹及癰疹入腹殺人方

澤蘭

芎藭

附子

茵芋

藁本

莽草

細辛

各十
二銖

右七味呖咀以水三升煮取一升半分四服先與此湯然後作餘治

治小兒手足及身腫方

巴豆五十枚去心皮以水三升煮取一升以綿內湯中拭病上隨手消并治癰疹

又方以小便溫暖漬之良

論曰小兒頭生小瘡浸淫疽癢黃膏出不生痂連年不瘥者亦名妬頭瘡以赤龍皮湯及天麻湯洗之內服漏蘆湯不宜傳飛烏膏散及黃連胡粉水銀膏散方具在別卷

藜蘆膏治小兒一切頭瘡久即疽癰不生痂方

藜蘆

黃連

雄黃

黃芩

松脂

各二兩

猪脂

半斤

礬石

五兩

右七味為末煎令調和先以赤龍皮天麻湯洗訖傳

之

赤龍皮槲木皮是也

治小兒頭瘡經年不瘥方

松脂

苦參

黃連

各一兩半

大黃

胡粉

各一兩

黃芩

水銀

各一兩六銖

礬石

半兩

蛇床子

十八
錄

右九味為末以臘月猪脂和研水銀不見傳之

又方取屋塵末和油瓶下滓以皂莢湯洗傳之

又方取大蟲脂傳之亦治白禿

又方髮中生瘡頂白者皆以熊白傳之

治小兒頭瘡方

胡粉

一兩

黃連

二兩

右二味為末洗瘡去痂拭乾傳之即瘥更發如前傳

之

又方

胡粉

連翹

各一兩

水銀

半兩

右三味以水煎連翹內胡粉水銀和調傳之

又方

白松脂

胡粉

各二兩

水銀

一兩

猪脂

四兩

右四味合煎去滓內水銀粉調傳之大人患同

苦參湯治小兒頭瘡方

苦參

黃芩

黃連

黃蘗

甘草

大黃

芍藥

各一兩

茯苓子

合三

右八味咀咀以水六升煮取三升漬布搗瘡上日數

過

治小兒頭上惡毒腫瘰癧諸瘡方

男子尿尖燒灰和臘月猪脂先以酢泔清淨洗拭乾
傳之

治小兒秃頭瘡方

取雄雞屎陳醬汁苦酒和以洗瘡了傳之

又方芫花臘月猪脂和如泥洗去痂傳之日一度

千金翼治

白禿

治小兒頭禿瘡方

葶藶子細末先洗傳之

又方不中水蕪菁葉燒作灰和猪脂傳之

治小兒頭禿瘡無髮苦癢方

野葛末

猪脂

羊脂

各一兩

右三味合煎令消待冷以傳之不過三上

治少小頭不生髮一物楸葉方

楸葉擣取汁傳頭上立生

治小兒頭不生髮方

燒鯽魚灰末以醬汁和傳之

治小兒癰瘡方

冢中石灰傳之厚著之良

又方燒桑根灰傳之并燒烏羊角作灰相和傳之

治小兒疽癰方

丹砂

大黃

各三十銖

雄黃

蘭茹

漆頭者

雌黃

各二十銖

礬石

馬齒者

莽草

各十銖

黃連

三十銖

右八味㕮咀以豬脂一升三合微火煎三上三下膏成去滓下諸色末攪凝傳之

治小兒惡瘡方

熬豉令黃為末傅瘡上不過三傳愈

治小兒疽極月初即生常有黃水出方

酢和油煎令如粥及熱傳之二日一易欲重傳則以
皂莢湯洗瘡乃傳之

治小兒月蝕瘡隨月生死方

以胡粉和酥傳之五日瘡

治月蝕九竅皆有瘡者方

燒蚯蚓屎末和猪膏傳之

又方水和粉傳之

治小兒浸淫瘡方

竈中黃土 髮灰

右二味各等分為末以豬脂和傅之

治小兒黃爛瘡方

四交道中土

竈下土

右二味各等分為末以傅亦治夜啼

又方燒艾灰傅之

又方燒牛屎傅之亦可滅癩

治小兒疥方

燒竹葉為灰雞子白和傳之日三亦治疥瘡

又方燒亂髮灰和臘月猪脂傳之

又方以臭酥和胡粉傳之

治小兒頭面瘡疥方

麻子五升為末以水和絞取汁與蜜和傳之若有白

犬膽傳之大佳

治小兒濕癬方

枸杞根搗作末和臘月猪膏傳之

又方挑青皮擣末和醋傅之日二

又方煎馬尿以洗

又方指破以牛鼻上津傅之

又方燒狗屎灰和猪脂塗之

治小兒身上生赤疵方

取馬尿洗日四五度

治小兒身上有赤黑疵方

針父脚中取血貼疵上即消

又方取狗熱尿傳之皮自卷落

治小兒疣目方

以針及小刀子決目四面令血出取患瘡人瘡中汁黃膿傳之莫近水三日即膿潰根動自脫落

備急千金要方卷十三

欽定四庫全書

備急千金要方卷十四

唐 孫思邈 撰

宋 林億等 校正

少小嬰孺方

小兒雜病第九

方灸法

治小兒臍中生瘡方

桑汁傳乳上使兒飲之

又方飲殺羊乳及血

治小兒風臍遂作惡瘡歷年不瘥方

取東壁上土傳之大佳若汁不止燒蒼耳子粉之

又方乾蟻螬蟲末粉之不過三四度瘥

治小兒臍不合方

取車轄脂燒灰日一傳之

又方燒蜂房灰為末傳之

治小兒臍中生瘡方

燒甌帶灰和膏傳之

治小兒臍赤腫方

杏仁

半兩

猪頰車髓

十八銖

右二味先研杏仁如脂和髓傳臍中腫上

白石脂散治小兒臍汁不止兼赤腫方

以白石脂細研熬令微暖以粉臍瘡日三四度
治小兒鵝口不能飲乳方

鵝屎汁漉兒口中

又方黍米汁塗之

又方取小兒父母亂髮淨洗纏桃枝沾取井花水東向
向日以髮拭口中得口中白乳以置水中七過瀝洗三
朝作之

治小兒心熱口為生瘡重舌鵝口方

柘根剉五升無根弓材亦佳以水五升煮取二升去
滓更煎取五合細細傳之數次良

治口瘡白漫漫方

先以父淨髮拭口次取桑汁塗之

治重舌舌強不能收唾方

鹿角末如大豆許安舌下日三四度亦治小兒不能乳

又方取蛇蛻燒末以雞毛蘸醇醕點藥掠舌下愈

治小兒重舌方

取田中蜂房燒灰酒和塗喉下愈

又方衣魚塗舌上

又方竈月下黃土末苦酒和塗舌上

又方二家屠肉切令如指大摩舌上兒立能啼
又方赤小豆末醋和塗舌上

又方燒簸箕灰傳舌下

又方黃蘗以竹漚漬取細細點舌上良

治重舌方

灸行間隨年壯穴在足大趾岐中

又灸兩足外踝上三壯

治小兒舌上瘡方

蜂房燒灰屋間塵各等分和勻傳之

又方桑白汁塗乳與兒飲之

又方羊蹄骨中生髓和胡粉傳之

治舌腫強滿方

滿口含糖醋良

又方飲殺羊乳即瘥

治小兒口瘡不得吮乳方

大青

銖十八

黃連

銖十二

右二味咬咀以水三升煮取一升二合一服一合日
再夜一

又方

蜜二升

甘草

如指大三寸

臘月豬脂

一斤

右三味合煎相得含如棗大稍稍咽之日三

又方礬石如雞子大置醋中塗兒足下二七遍愈

治小兒燕口兩吻生瘡方

燒髮灰和豬脂傅之

治小兒口下黃肌瘡方

取殺羊髭燒作灰和臘月猪脂傳之角亦可用

治口傍惡瘡方

亂髮灰

胡絮灰

黃連

乾薑

右四味等分為散以粉瘡上不過三遍

治口噤赤者心噤白者肺噤方

雞屎白棗大綿裹以水一合煮二沸分再服

治小兒口噤方

鹿角粉

大豆末

右二味等分和乳塗乳上飲兒

又方

驢乳

猪乳
各二升

右二味合煎得一升五合服如杏仁許三四服瘥
崔尿圓治小兒卒中風口噤不下一物方

崔尿如麻子丸之飲下即愈大良雞尿白亦佳

治小兒口中涎出方

以白羊尿內口中

又方以東行牛口中沫塗口中及頤上又桑白汁塗之
瘥

治小兒卒毒腫著喉頸肚熱妨乳方

升麻

射干

大黃

各一兩

右三味呖咀以水一升五合煮取八合一歲兒分三
服以滓薄腫上冷更暖以薄大兒以意加之

升麻湯治小兒喉痛若毒氣盛便咽塞并治大人咽喉

不利方

升麻

生薑

射干

各二兩

橘皮

一兩

右四味㕮咀以水六升煮取二升去滓分三服

治小兒喉痺腫方

魚膽二七枚以和竈底土塗之瘥

治小兒喉痺方

桂心

杏仁

各半兩

右二味為末以綿裹如棗大含咽汁

治小兒解顙方

熬蛇蛻皮為末和猪頰車中髓傳頂上日三四度

又方猪牙頰車髓傳顙上瘥

治小兒腦長解顙不合羸瘦色黃至四五歲不能行半

夏熨方

半夏

生薑

芎藭

各一升

細辛

三兩

桂心一尺

烏頭

十枚

右六味㕮咀以醇苦酒五升漬之晬時煮三沸絞去

滓以綿一片浸藥中適寒溫以熨顙上冷更溫之復熨如前朝暮各三四熨乃止二十日可愈

治小兒解顙用生蟹足傳方

生蟹足

白斂

各半兩

右二味搗末以乳汁和傳顙上立愈

治小兒解顙細辛傳方

細辛

桂心

各半兩

乾薑

十八銖

右三味為末以乳汁和傳顙上乾復傳之兒面赤即

愈

治小兒顙開不合方

防風

一兩半

栢子仁

白芨

各一兩

右三味為末以乳和傅顙上日一十日知二十日愈
又方取猪牙車骨煎取髓傅顙上愈

小兒顙陷方

灸臍上下各半寸及鳩尾骨端又足太陰各一壯

治小兒狐疝傷損生癰方

桂心

十八銖

白朮

一兩八銖

地膚子

二兩半

右三味為末以蜜和丸白酒服如小豆七丸日三

治亦

大八

又方

芍藥

茯苓

各十八銖

防葵

一作防風

大黃

各半兩

半夏

桂心

蜀椒

各六銖

右七味為末蜜和服如大豆一丸日五服可加至三

丸

五等圖治小兒陰偏大又卵核堅癰方

黃蘗

香豉

牡丹

防風

桂心

各二兩

右五味為末蜜丸如大豆兒三歲飲服五丸加至十丸兒小以意酌量著乳頭上服之

治小兒卵腫方

取雞翅六莖燒灰服之隨卵左右取翮

古今錄驗云治陰大如斗

治小兒氣癰方

土瓜根

芍藥

當歸

各一兩

右三味㕮咀以水二升煎取一升服五合日二
又方三月上除日取白頭翁根搗碎隨偏處傳之一宿
作瘡二十日愈

治氣癰方

灸足厥陰大敦左灸右右灸左各一壯

治小兒陰瘡方

以人尿灰傳之又狗屎灰傳之又狗骨灰傳之又馬

骨未傳之

治小兒岐股間連陰囊生瘡汁出先癢後痛十日五日
自瘥或一月或半月復發連年不瘥者方

灸瘡搔去痂帛拭令乾以蜜傳更洩麩作燒餅熟即
以錫塗餅上熨之冷即止再度瘥

治小兒陰腫方

狐莖炙搗末酒服之

又方灸大敦七壯

又方斫桑木白汁塗之

又方搗蕪菁薄上

又方搗垣衣傅之又以衣中白魚傅之

又方猪尿五升水煮沸布裹安腫上

治小兒陰瘡方

取狼牙濃煮汁洗之

又方黃連胡粉等分以香脂油和傅之

治小兒核腫壯熱有實方

青木香

甘草

石膏

甘遂

各十銖

麝香

三銖

大黃

前胡

各一兩

黃芩

半兩

右八味㕮咀以水七升煮取一升九合每服三合日

四夜二

鼈頭圓治小兒積冷久不瘥後餘脫肛不瘥腹中冷肛中疼痛不得入者方

死鼈頭

二枚炙令焦

磁石

四兩

桂心

三兩

小蛭皮

一枚炙令焦

右四味為末蜜丸如大豆兒三歲至五歲服五丸至十丸日三兒年大以意加之

小兒脫肛方

灸頂上旋毛中三壯即入又灸尾翠骨三壯又灸臍中隨年壯

治小兒疳濕瘡方

鐵衣著下部中即瘥

又方灸第十五椎俠脊兩傍七壯未瘥加七壯

治小兒疳瘡方

以猪脂和胡粉傅之五六度

又方嚼麻子傅之日六七度

又方羊膽二枚和醬汁於下部灌之猪脂亦佳

治濕瘡方

濃煮地榆汁洗浴每日二度

治小兒久痢膿濕蜜方

艾葉五升以水一斗煮取一升半分為三服

除熱結腸圓斷小兒熱下黃赤汁沫及魚腦雜血肛中
瘡爛坐蠱生蟲方

黃連

藥皮

苦參

鬼臼

獨活

橘皮

芍藥

阿膠

各半兩

右八味為末以藍汁及蜜丸如小豆日服五丸至十

丸

冬無藍汁可用藍
子一合春蜜和丸

治小兒蛇蟲方

削棟木上蒼皮以水煮取汁飲之量大小多少為此

有小毒

治小兒羸瘦有虻蟲方

藿蘆二兩以水一升米二合煮取米熟去滓與服

又方蒲蓄三兩水一升煮取四合分服之搗汁服亦佳

又方

桃白皮

三兩

東引吳茱萸根白皮

四兩

右二味㕮咀以酒一升二合漬之一宿漸與服取瘥

又方取猪膏服之

一云治
虻蟲

又方擣槐子內下部中瘡為度

一云治
螻蟲

又方棟實一枚內孔中

一云治
螻蟲

治寸白蟲方

東行石榴皮一把水一升煮取三合分服

又方桃葉擣絞取汁服之

治小兒三蟲方

雷丸

芎藭

右二味各等分為末服一錢七日三

治大便竟出血方

鼈頭一枚炙令黃黑為末以飲下五分匕多少量兒

大小日三服

又方燒車釭一枚令赤內一升水中分二服

又方燒甌帶末傳乳頭上令兒飲之

治小兒尿血方

燒鵲巢灰并花水服之亦治夜尿牀

又方尿血灸第七椎兩傍各五寸隨年壯

治小兒遺尿方

瞿麥

石韋

龍膽

皂莢

桂心

各半兩

雞腸草

人參

各一兩

車前子

一兩六銖

右八味為末蜜丸每食後服如小豆大五丸日三加至六七丸

又方小豆葉搗汁服

又方燒雞腸為末漿水服方寸匕日三一云面北斗服

又方灸臍下一寸半隨年壯又灸大敦三壯亦治尿

血

地膚子湯治小兒熱毒入膀胱中忽患小便不通欲小便則澀痛不出出少如血須臾復出方

地膚子

瞿麥

知母

黃芩

枳實

升麻

葵子

猪苓

各六銖

通草

海藻

橘皮

各三銖

大黃

十八銖

右十二味㕮咀以水三升煮取一升一日至七日兒服一合為三服八日至十五日兒一合半為三服十

六日至二十日兒二合為三服四十日兒以此為準
五十日已上七歲已下以意加藥並水

治小兒淋方

車前子一升水二升煮取一升分服

又方煮冬葵子汁服之

又方取蜂房亂髮燒灰以水服一錢匕日再

治小兒小便不通方

車前草

切一升小麥一升

右二味以水二升煮取一升二合去滓煮粥服日三
四

又方冬葵子一升以水二升煮取一升分服入滑石末
六銖

治小兒癰方

蜥蜴一枚燒末酒服之

治小兒吐血方

燒蛇蛻皮末以乳服之并治重舌

又方取油三分酒一分和之分再服

治小兒鼻塞生息肉方

通草

細辛

各一兩

右二味搗末取藥如豆著綿纏頭內鼻中日二

治小兒鼻塞不通濁涕出方

杏仁

半兩

蜀椒

附子

細辛

各六銖

右四味咬咀以醋五合漬藥一宿明日以猪脂五合

煎令附子色黃膏成去滓了更以塗絮導鼻孔中日

再兼摩頂

治小兒聾耳方

未石硫黃以粉耳中日一夜一

治小兒耳瘡方

燒馬骨灰傳之

又方燒雞屎白筒中吹入

治小兒齒落久不生方

以牛尿中大豆二七枚小開豆頭以注齒根處數度

即生

又方取雄鼠屎二七枚以一尿拭一齒根處盡此上二
十日即生雄鼠屎頭尖

治小兒四五歲不語方

未赤小豆酒和傳舌下

又方灸足兩踝各三壯

治小兒數歲不能行方

取葬家未開戶盜食來以哺之日三便起行

治小兒不能乳方

雀屎四枚為末著乳頭飲兒兒大十枚

蒲黃湯治小兒落床墮地如有瘀血腹中陰陰寒熱不肯乳哺但啼哭叫喚方

蒲黃

麥門冬

大黃

黃芩

各十銖

甘草

八銖

芒硝

七銖

黃連

十二銖

右七味㕮咀以水二升煮取一升去滓內芒硝分三服消息視兒羸瘦半之大小便血即愈忌冷食

治小兒食不知饑飽方

鼠屎二七枚燒為末服之

治小兒食土方

取肉一斤繩繫曳地行數里勿洗火炙與食

治小兒噦方

生薑汁

牛乳各五合

右二味煎取五合分為二服

又方取牛乳一升煎取五合分五服

治小兒疰方

竈中灰鹽等分相和熬熨之

治小兒悞吞鍼方

取磁石如棗核大或吞或含其針立出


治小兒悞吞鐵物等方

艾蒿一把剉以水五升煮取一升服之即下

治小兒蠅蚋咬遶腹匝即死方

擣蒺藜葉傳之無葉子亦可

又方取鷲窠中土猪脂和傅之乾即易之



備急千金要方卷十四

欽定四庫全書

子部

備急千金要方卷十五
六

詳校官太醫院醫士臣舒岱

編修臣倉聖脈覆勘

總校官中書臣朱鈐

校對官中書臣胡紹基

謄錄舉人臣汪師曾

欽定四庫全書

備急千金要方卷十五

唐 孫思邈 撰

宋 林億等 校正

七竅病方

目病第一

論
法
灸法

論曰凡人年四十五已後漸覺眼暗至六十已後還漸
目明治之法五十已前可服瀉肝湯五十已後不可瀉
肝目中有疾可傳石膽散藥等無病不可輒傳散但補

肝而已自有肝中有風熱令人眼昏暗者當灸肝輸及服除風湯圓散數十劑當愈

生食五辛

接熱飲食

熱餐麪食

飲酒不已

房室無節

極目遠視

數看日月

夜視星火

夜讀細書

月下看書

抄寫多年

雕鏤細作

博奕不休

久處煙火

泣淚過多

刺頭出血過多

右十六件並是喪明之本養性之士宜熟慎焉又有

馳騁田獵冒涉風霜迎風追獸日夜不息者亦是傷目之媒也恣一時之浮意為百年之痼疾可不慎歟凡人少時不自將慎年至四十即漸眼昏若能依此慎護可得白首無他所以人年四十已去常須瞑目勿顧他視非有要事不宜輒開此一術護慎之極也其讀書博奕等過度患目者名曰肝勞若欲治之非三年閉目不視不可得瘥徒自瀉肝及作諸治終是無効人有風疹必多眼昏先攻其風其暗自瘥

足太陽陽明手少陽脉動發目病黃帝問曰余嘗上清
冷之臺中陞而顧匍匐而前余私異之竊內怪之或獨
冥視安心定氣久而不解被髮長跪俛而視復久之又
不已卒然自止何氣使然岐伯對曰五臟六腑之精氣
皆上注于目而為之睛睛之果者為眼骨之精為瞳子
筋之精為黑眼血之精為其絡果氣之精為白眼肌肉
之精為約束果契筋骨血氣之精而與脉并為系系上
屬于腦後出於項中故邪中于項因逢身之虛其入深

則隨眼系以入于腦入于腦則轉轉則引目系急急則目眩以轉矣邪中其睛則其睛所中者不相比則睛散睛散則岐故見兩物目者五臟六腑之精也營衛魂魄之所營也神氣之所生也故神勞則魂魄散志意亂是故瞳子黑眼法于陰白眼赤脉法于陽故陰陽合揣靈樞轉作俱而精明矣目者心之使也心者神之舍也故神分精亂而不專靈樞作轉卒然見非常之處精神魂魄散不相得故曰惑帝曰余疑何其然也余每之東苑未嘗不惑

去之則復余惟獨為東莞勞神乎何其異也岐伯曰不然夫心有所喜神有所惡卒然相感則精亂視誤故神惑神移乃復是故間者為迷甚者為惑

目眥外決于面者為兌眥在內近鼻者上為外眥下為內眥目赤色者病在心白色者病在肺青色者病在肝黃色者病在脾黑色者病在腎黃色不可名者病在胸中

診目痛赤脉從上下者太陽病從下上者陽明病從外

走內者少陽病

夫鼻洞鼻洞者濁下不止傳為軌膏瞑目故得之氣厥
足陽明有俠鼻入于面者名曰懸顙屬口對入係目本
視有過者取之損有餘並不足反者並甚足太陽有通
項入於腦者正屬目本名曰眼系頭目固痛取之在項
中兩筋間入腦乃別陰蹻陰陽相交陽入陰出陽交于
兌皆陽氣盛則瞑目陰氣絕則眠瞑

神麴圓主明目百歲可讀注書方

神麴

兩四

磁石

兩二

光明砂

兩一

右三味為末鍊蜜為丸如梧子飲服三九日三不禁
常服益眼力衆方不及學者宜知此方神驗不可言
當祕之

瓜子散補肝治眼漠漠不明亦名十子散方

冬瓜子

青箱子

茺蔚子

枸杞子

牡荊子

蒺藜子

菟絲子

蕪菁子

決明子

地膚子

栢子仁

各二合

壯桂

蓼莪根

各二兩

麤仁

一合二合

車前子

一兩

細辛

半兩一兩半

右十六味治下篩食後以酒服方寸匕日二神驗

補肝圓治眼暗方

青箱子

桂心

葶藶子

杏仁

細辛

茺蔚子

枸杞子

五味子

各一兩

茯苓

黃芩

防風

地膚子

澤瀉

決明子

麥門冬

麤仁

各一兩六銖

車前子

菟絲子

各二合

乾地黄

三兩

兔肝

一具

右二十味為末蜜丸飲下二十丸如梧子日再加至

三十九

又方治眼暗眵眵不明寒則淚出肝痺所損之方

兔肝

二具

栢子仁

乾地黄

茯苓

細辛

蕤仁

枸杞子

各一兩
六銖

防風

芎藭

薯蕷

各一兩

車前子

合一

五味子

十八銖

甘草

半兩

菟絲子

合一

右十四味為末蜜丸酒服如梧子二十丸日再服加

至四十丸

補肝散治目失明漠漠方

決明子

半升

蓼子

一合熬令香

青羊肝

一具去上膜薄切之以新瓦瓶

子未用者淨拭內肝於中炭火上炙之令極乾汁盡木之

右三味合治下篩以粥飲食後服方寸匕日二稍加至三匕不過兩劑能一歲服之可夜讀細書

又方治三十年失明方

鍾乳粉

雲母粉

各銖成者

細辛

茯苓

遠志

五味子

等分

右六味治下篩以酒服五分匕日三加至一錢匕

補肝蕪菁子散常服明目方

蕪菁子三升淨淘以清酒三升煮令熟曝乾治下篩

以井花水和服方寸匕稍加至三匕無所忌可少少

作服之令人充肥明目洞視水煮酒服亦可

千金翼用水煮

三易水

又方胡麻一斗蒸三十遍治下篩每日酒服一升

又方服小黑豆每日空心吞二七粒

又方三月三日採蔓菁花陰乾治下篩空心井花水服
方寸匕久服長生明目可以夜讀細書

補肝散治男子五勞七傷明目方

地膚子

一斗陰
乾為末

生地黃

十斤搗
取汁

右二味以地黃汁和散曝乾更為末以酒服方寸匕

日二

又方白瓜子七升絹袋盛攪沸沸湯中三遍曝乾以酢

五升浸一宿曝乾治下篩酒服方寸匕日三服之百日
可夜寫細書

梔子仁煎治肝實熱目皆痛如刺方

梔子仁

決明子

蕤仁

各一兩

車前葉

秦皮

各一兩
六銖

石膏

一兩碎
如小豆

苦竹葉

二合

細辛

半兩

赤蜜

三合

右九味㕮咀以井花水三升煮取七合去滓下蜜更
煎取四合以綿濾之乾器貯密封勿使草芥落中以

藥汁細細仰臥以傳目中

瀉肝湯治眼赤漠漠不見物息肉生方

柴胡

芍藥

大黃

各四兩

決明子

澤瀉

黃芩

杏仁

各三兩

升麻

枳實

梔子仁

竹葉

各二兩

右十一味㕮咀水九升煮取二升七合分三服熱多

體壯加大黃一兩羸老去大黃加梔子仁五兩

又方治眼風赤暗方

前胡

芍藥

各四兩

生地黄

十兩

芒硝

黃芩

茯苓

白芷

枳實

各三兩

人參

白朮

梔子仁

澤瀉

各二兩

甘草

細辛

各一兩

竹葉

五升

右十五味㕮咀以水一斗二升先煎竹葉取九升去

滓下諸藥煮取三升半分三服

洗肝乾藍煎治肝熱不止衝眼眼眦赤赤脉息肉痛閉

不開熱勢彭彭不歇及目睛黃方

乾藍

車前葉

苦竹葉

各三升

細辛

秦皮

蕤仁

梔子仁

芍藥

各三兩

決明子

四兩

升麻

二兩

右十味㕮咀以水二斗先煮乾藍車前竹葉取一斗
去滓澄清取八升內藥煮取三升分三服須利加芒
硝二兩

大棗煎治目熱眦赤生赤脉侵睛息肉急痛閉不開如
芥在眼礫痛方

大棗

七枚去
皮核

黃連

二兩碎
綿裹

淡竹葉

切五
合

右三味以水二升煮竹葉取一升澄清取八合內棗

肉黃連煎取四合去滓令淨細細以傳目眥中

治目中息肉方

臙脂

石鹽

末

右二味和合令調注目兩眥頭日三夜一瘥

又方五加不聞水聲者根去土取皮擣末一升和上酒

二升浸七日外一日兩時服之禁醋二七日徧身生瘡

若不出未得藥力以生熟湯浴之取毒瘡出瘡

洗眼湯治熱上出攻目生障翳目熱痛汁出之方

秦皮

黃蘗

決明子

黃連

黃芩

麤仁

各十
八銖

梔子

七
枚

大棗

五
枚

右八味㕮咀以水二升浸煮取六合澄清仰卧洗日

一

治目生翳方

貝子十枚燒灰治下篩取如胡豆著翳上日二正仰

卧令人傳之炊久乃拭之息肉者加真珠如貝子等分

治目赤及醫方

烏賊骨

鉛丹

大小等分

右二味合研細和白蜜如泥蒸之半食久冷著眼四眥

又方白羊髓傳之良

又方熟羊眼睛曝乾治下篩傳目兩角

又方新生孩子胞衣曝乾燒末傅目眚中

又方古錢

一枚

鹽

方寸七

右二味合治下篩傅目眚中

治目風淚出浮翳多膿爛眚方

乾薑

決明子

礬石

麝仁

細辛

黃連

戎鹽

各六銖

銅青

三銖

右八味㕮咀以少許水浸一宿明旦以好白蜜八合和之著銅器中綿蓋器上著甌中以三斗麥屑蒸之

飯熟藥成絞去滓以新死大雄鯉魚膽二枚和內藥中又以大錢七枚常著藥底魚常著銅器中竹簪綿裹頭以注目背頭晝夜三四不避寒暑數著藥乾又以魚膽和好覆藥器頭勿令氣歇善

治熱瞽漫睛方

以羊筋漱口熟嚼夜卧開目內之即閉目睡去膜明

日即瘥

千金翼以治
眯目不明

治風瞽方

取死猪鼻烧灰治下篩日一向日水服方寸匕

治目熱生膚赤白膜方

取雄雀尿細直者人乳和熟研以傳之當漸消爛
又方以蛔蟲燒為末傳之良

治人馬白膜漫睛方

以雞翎截之近黑睛及當白睛啣之膜自聚鉤針鉤
挽之割去即見物以綿當眼上著血斷三日瘥

蕩風散治目白膚風淚下方

刪繁方名
真珠散

光明朱砂

半兩

具齒

五枚炭上熟燒為末

夜中白魚

七枚

乾薑

三銖

一方用生薑自然汁澄粉代乾薑

右四味於新磁鉢內研之厚帛三下為散仰卧令人

取小指爪挑少許傳目中取瘥為度

千金翼名真珠散主目翳覆腫

睛不見物

治目中生息肉膚翳稍長欲滿目閉瞳子及生珠管方

具齒

七枚燒為末

真珠

等分

右二味合治如粉以注醫肉止日三度甚良亦治目中眯不出

治目生珠管方

滑石

一作冷石

手爪甲

燒

龍骨

具齒

丹砂

各等分

右五味治下篩以新筆點取當珠管上日三度良治毒病後目赤痛有翳方

以青布掩目上以冷水漬青布數易之

治熱病後生醫方

鼓二七枚燒為末內管中以吹目中

治熱病後眼暗失明方

以羊膽傳之旦暮各一

治風眼爛眦方

竹葉

黃連各一兩

栢白皮一兩半

右三味呖咀以水二升煮取五合稍用滴目兩眦日

三四度

治胎赤眼方

取槐木枝如馬鞭大長二尺齊頭油麻一匙置銅鉢中旦使童子以水研之至暝止夜卧時洗目傳晷日三良

治目爛赤方

取三指撮鹽置古文錢上重重火燒赤投少醋中足淹錢以綿沾汁注目眚中

乳汁煎治目中風冷淚出眚赤癢方

黃連

十八銖

蕤仁

半兩

乾薑

一兩

右三味㕮咀以人乳汁一升浸藥一宿明旦以微火

煎取三合綿絞去滓取如黍米許內目眦頭日三、張

仲方三
味等分

治目中風腫痛除熱揉眼方

礬石三兩燒令汁盡以棗膏和如彈丸揉眼上下食

頃日三止

洗眼湯治目赤痛方

甘竹葉

七枚

烏梅

古錢

各三枚

右三味以水二升漬藥半日東向竈煮三沸三上三下得二合臨欲眠注目眚

治目卒腫方

以酢漿水作鹽湯洗之日四五度

治目卒癢痛方

削乾薑令圓滑內眚中有汁拭却復內薑味盡易之
治五臟客熱上衝眼內外受風冷目痛不明方

地膚子

瓜仁子

青箱子

蒺藜子

芫蔚子

藍子

菟絲子

蕤仁

千金翼作車前子各二合

栢子仁

合半

決明子

五合

細辛

一兩六銖

桂心

一兩十八銖

大黃

二兩

螢火

六銖

黃連

一兩半

右十五味為末蜜丸如梧子每服三十丸食後服日

三

千金翼無柏子仁

治目赤痛方

雄黃

一銖

細辛

黃連

乾薑

各二銖

右四味合治如粉以綿裹釵股唾濡頭注藥末內大背頭急閉目目中淚出須臾止勿將手近勿將帛裹勿洗之

又方雄黃

乾薑

黃連

礬石

各六銖

右四味合治並如前方一方加細辛六銖

治眼赤暗方

古青錢

三枚

青鹽

一兩六銖

杏仁

杏未熟時取仁搗汁一合

右三味合內埴器中封頭勿泄氣百日後出著目四背頭日二三避風冷

治眼暗赤冷淚方

麤仁

波斯鹽

右二味等分治下篩以驢生脂和每夜傅目四角以一粟大窠室中將息一月日瘥忌五辛失明者三十日傳之

治目痛及淚出不止方

削附子作蠶屎大內目中卧良

治目不明淚出方

以烏雞膽臨卧傳之

治雀盲方

地膚子

五兩

決明子

一斤

右二味為末以米飲汁和丸食後服二十丸至三十丸日二盡即更合瘡止

治雀目術

令雀盲人至黃昏時看雀宿處打令驚起雀飛乃呪
曰紫公紫公我還汝盲汝還我明如此日日瞋三過

作之眼即明曾試有驗

肘後云刪繁
載支太醫法

真珠散治肝氣虛寒眼青眦眦不見物方

真珠

一兩
研

白蜜

二合

鯉魚膽

鯉魚腦

各一
枚

右四味和合微火煎兩沸綿裹內目中當汁出藥歇
更為之

治目眦眦無所見方

青羊肝一具細切以水一斗內銅器中煮以麴餅覆上上鑽兩孔如人眼正以目向就熏目不過再熏即

瘡

千金翼若眼幕無所見不用麴餅

治眼暗方

以銅器盛大酢三四升煎七八日覆器濕地取銅青一合以三月杏白仁一升取汁和銅青傳之不過三四度大良

又方

古錢

枚七

銅青

乾薑

石鹽

胡粉

薪蒿子

各中棗大

烏頭

棗核大

黃連

銖三

細辛

銖五

麝仁

一百三十枚

酢

合二

清酒

合五

楸葉

一把取汁

右十三味治下篩合煎取三分去一盛瓷器中若燥

取人乳和傅目慎風冷

又方每朝含黃蘗一爪甲許使津置掌中拭目訖以水洗之至百日眼明此法乃可終身行之永除眼疾神良

又方

柴胡

銖六

決明子

銖十八

右二味治下篩人乳汁和傳目可夜書見五色

治眼暗方

七月七日生苦瓠中白絞取汁一合以酢一升浸古文錢七枚微火煎減半以米許大內背中

治眼漠漠無所見方

麴仁

秦皮

黃連

各十銖

螢火

枚七

決明子

合一

右五味㕮咀以水八合微火煎取三合冷以綿注洗
目日三度

蕪菁子常服主輕身益氣明目方

蕪菁子一升以水四升煮令汁盡出曝乾復以水四
升煮如前法三煮三曝治下篩飲服方寸匕

千金翼
云百日

身熱瘡出
不久自瘥

治明目令髮不落方

十月上巳日收槐子內新淨甕中以盆密封口三七
日發封洗去皮取子從月一日復一枚二日二枚日
別加計十日服五十五枚一月日服一百六十五枚
一年服一千九百八十枚小月減六十枚此藥主補
腦早服之髮不白好顏色長生益壽先病冷人勿服
之

肘後云
扁鵲方

又方牛膽中漬槐子陰乾百日食後吞一枚十日身輕
三十日白髮再黑至百日通神

治目中眵不出方

以蠶砂一粒吞下即出

治稻麥芒等入目中方

取生蟬蛸以新布覆目上將蟬蛸從布上摩之芒出
著布良

治沙石草木入目中不出方

以雞肝注之

又方以書中白魚和乳汁注目中

治目中昧法

旦起對門戶跪拜云門戶狹小不足宿客方便瘡
治目為物所傷觸青黑方

煮羊肉令熱熨勿令過熱猪肝亦得

治目痛不得睡方

暮炙新青布熨并蒸大豆袋盛枕之夜常令熱

目中赤痛從內眥始取之陰蹻

目中痛不能視上星主之先取諱後取天牖風池

青盲遠視不明承光主之

目瞋遠視眴眴目窓主之

目眴眴赤痛天柱主之

目眩無所見偏頭痛引目外眥而急頷獸以主之

目遠視不明惡風淚出憎寒頭痛目眩眥內眥赤痛遠視眴眴無見眥癢痛淫膚白翳精明主之

青盲無所見遠視眴眴目中淫膚白膜覆瞳子巨窳主之

目不明淚出目眩瞶瞳子癢遠視眴眴昏夜無見目瞤
動與項口參相引喎僻口不能言刺承泣

目痛僻戾不明四白主之

目赤目黃權竅主之

眇目水淋主之

目痛不明斷交主之

目瞤身汗出承漿主之

青盲瞤目惡風寒上關主之

青盲商陽主之

瞶目眈眈偏歷主之

眼痛下廉主之

目中白翳前谷主之

目痛泣出甚者如脫前谷主之

白膜覆珠子無所見解谿主之

灸法餘穴見前

瞶目眈眈少氣灸五里右取左左取右

眼暗灸大椎下數節第十當脊中安灸二百壯惟多為
佳至驗

肝勞邪氣眼赤灸當容百壯兩邊各爾穴在眼小眥近
後當耳前三陽三陰之會處以兩手按之有上下橫脉
則是與耳門相對是也眼急痛不可遠視灸當瞳子上
入髮際一寸隨年壯穴名當陽

風醫患右目灸右手中指本節頭骨上五壯如小麥大
左手亦如之

風癢赤痛灸人中近鼻柱二壯仰卧灸之

目卒生翳灸大指節橫文三壯在左灸右在右灸左良

備急千金要方卷十五

欽定四庫全書

備急千金要方卷十六

唐 孫思邈 撰

宋 林億等 校正

七竅病方

鼻病第二

論方
灸法

治鼻塞腦冷清涕出方

通草

辛夷

各半
兩

細辛

甘遂

一作
甘草

桂心

芎藭

附子

各一
兩

右七味為末蜜丸綿裹內鼻中密封塞勿令氣洩丸
如大麻子稍加微覺小痛擣薑為丸即愈用白狗膽
汁和之更佳

治鼻塞常有清涕出方

細辛

蜀椒

乾薑

芎藭

吳茱萸

附子

各十
八銖

桂心

一
兩

皂莢屑

半
兩

猪膏

一
升

右九味㕮咀以綿裹苦酒漬一宿取猪膏煎以附子

色黃為度去滓綿裹內鼻孔中并摩鼻上

治涕出不止方

灸鼻兩孔與柱齊七壯

香膏治鼻塞窒方

白芷

芎藭

通草

各十八銖

當歸

細辛

莽草

小品并千金翼以作薰草

辛夷

各十三銖

右七味㕮咀以苦酒漬一宿以不中水猪肪一升煎三上三下以白芷色黃膏成去滓綿沾如棗核大內

鼻中日三

小品加桂
心十八銖

香膏治鼻不利方

當歸

薰草

古今錄驗
用木香

通草

細辛

麝仁

各十八銖

芎藭

白芷

各半兩

羊髓

四兩猪
脂亦得

右八味㕮咀以微火合煎三上三下白芷色黃膏成

去滓取如小豆大內鼻中日二先患熱後鼻中生赤

爛瘡者以黃芩梔子代當歸細辛

治鼻塞氣息不通方

小薊一把呋咀以水三升煮取一升分二服

又方瓜蒂末少許吹鼻中亦可綿裹塞鼻中

又方

槐葉

五升

蔥白

切一升

豉

一合

右三味以水五升煮取三升分溫三服

治鼻塞多年不聞香臭清水出不止方

取當道車輾過蒺藜一把擣以水三升煎取熟先仰

卧使人滿口含取一合汁灌鼻中使人不過再度上
嚏必出一兩箇息肉似赤蛹一方有黃連等分同煎
治鼻齕方

通草

細辛

附子

右三味各等分為末以蜜和綿裹少許內鼻中

又方

甘遂

通草

細辛

附子

各等分

右四味為末以白雄犬膽和為丸如棗核大綿裹內

鼻中辛熱涕出四五升瘥亦治息肉

又方炙皂莢為末如小豆大以竹管吹鼻中

又方乾薑末蜜和塞鼻中吹亦佳

又方鐵鑠磨石取末以猪脂和綿裹內之經日肉出瘥

又方以馬新尿汁仰頭含滿口灌鼻中

又方伏面臨牀前以新汲冷水淋玉枕上後以瓜蒂末

綿裹塞之

治齕鼻有息肉不聞香臭方

瓜丁

細辛

右二味各等分為末以綿裹如豆大許塞鼻中須臾

即通

通草散治鼻中息肉不通利方

通草

半兩

礬石

真珠

各一兩

右三味為末搥綿如棗核取藥如小豆著綿頭內鼻中
日三易之一方有桂心細辛各一兩同前搗末和
使之

治軌鼻鼻中息肉不得息方

礬石

藜蘆

各六銖

瓜蒂

二七枝

附子

十二銖

右四味各搗篩合和以小竹管吹藥如小豆許于鼻孔中以綿絮塞鼻中日再以愈為度

古今錄驗加葶蘆半兩

治鼻中息肉方

炙蝟皮為末綿裹塞之三曰

又方細篩釜底墨水服之三五日

治鼻中息肉不聞香臭方

燒礬石末以面脂和綿裹著鼻中數日息肉隨藥消落

又方末瓜丁如小豆許吹入鼻中必消如此三四度良又方

細辛

釜底墨

右二味為末水和服方寸匕

又方綿裹瓜蒂末塞鼻中

羊肺散治鼻中息肉梁起方

羊肺

一具乾之

白朮

四兩

菰蓉

通草

乾薑

芎藭

各二兩

右六味為末食後以米飲服五分匕加至方寸匕

又方

通草

十二銖

真珠

六銖

礬石

細辛

各一兩

右四味為末搥綿如棗核沾散如小豆并綿內鼻中

日再三

治鼻中息肉方

灸上星二百壯穴在直鼻入髮際一寸

治鼻中生瘡方

燒祀竈飯末以傅鼻中

又方燒故馬絆末傅鼻中

又方偷孝子帽以拭之

又方烏牛耳垢傅之

又方以牛鼻津傅之

又方擣杏仁乳傅之亦燒核壓取油傅之

又方燒牛狗骨灰以臘月猪脂和傅之

治疳蟲蝕鼻生瘡方

燒銅筋頭以酢淬之數過取酢傅之又以人尿灰塗之瘥

治鼻痛方

常以油塗鼻內外酥亦得

治卒食物從鼻中縮入腦中介介痛不出方

牛脂若羊脂如指頭大內鼻中以鼻吸取脂須臾脂

消則物逐脂俱出也

論曰鼻頭微白者亡血設令微赤非時者死病人色白者皆亡血也凡時行衄不宜斷之如一二升已上恐多者可斷即以龍骨末吹之凡竅出血者皆用吹之

治大便出血及口鼻皆血出血上心胸氣急此是勞熱所致方

生地黄

八兩

蒲黃

一升

地骨皮

五兩

黃芩

芍藥

生竹茹

各三兩

右六味㕮咀以水八升煮取二升七合分溫三服
凡吐血衄血溺血皆藏氣虛隔氣傷或起驚悸治之

方

生竹皮

升一

芍藥

黃芩

兩各二

芍藥

當歸

桂心

甘草

兩各一

右七味㕮咀以水一斗煮竹皮減三升下藥煎取二
升分三服

治衄血方

生地黃

六兩

芍藥

一斤

細辛

六銖

伏龍肝

二枚如雞子大

桂心

白芷

乾薑

芍藥

甘草

吳茱萸

各三兩

右十味㕮咀以水三升酒七升煮取三升分三服

生地黄湯治鼻衄方

生地黃

八兩

黃芩

一斤

阿膠

甘草

各二兩

栝葉

一把

右五味㕮咀以水七升煮取三升去滓內膠煎取二

升半分三服

又方

生地黄

三斤切

阿膠

二兩

蒲黃

六合

右三味以水五升煮取三升分三服

又方地黄汁五合煮取四合空腹服之忌酒炙肉且服粳米飲

又方飲小薊汁良

又方以冷水淨漱口含水以蘆管吹二孔中

又方取亂髮五兩燒作灰以管吹鼻中棗核大不止益吹之以血斷止并水服方寸匕日三甚者夜二已困不識人者服亦佳

又方取人尿尖燒灰水服并吹少許鼻中止

又方五月五日取人尿燒作灰冷水服五分匕佳

又方以膠帖鼻頭上至頂及髮際三寸止

又方新馬尿汁灌鼻中及飲之良

又方以濕布薄胸上善

又方淳酢和土塗陰囊上乾易之

又方韭根蔥根取汁懸頭著一棗大內鼻中少時更著
兩三度瘥蔥白搗汁亦得

治鼻中出血不止方

地黄

乾者

梔子

甘草

各等分

右三味治下篩酒服方寸匕日三如鼻疼者加豉一
合鼻有風熱者以蔥涕和服如梧子五丸

又方搗楮葉汁飲三升大良

灸方張弓令弦向上病兒仰卧枕弦放四體如常卧法
衄時癢癢便灸足大指節橫理三毛中十壯劇者百壯
衄不止灸之并治陰卵腫

又灸風府一穴四壯不止又灸

又灸涌泉二穴各百壯

備急千金要方卷十六